

Les principales névralgies et neuropathies faciales

Critères diagnostiques selon la classification ICHD-3

Névralgie du trijumeau

Critère	Intitulé
A	Paroxysmes récurrents de douleur faciale unilatérale dans le territoire d'une ou plusieurs branches du nerf trijumeau, sans irradiation au-delà et répondant aux critères B et C
B	La douleur a toutes les caractéristiques suivantes: 1. dure entre une fraction de seconde et 2 minutes 2. intensité sévère 3. à type de choc électrique, d'élançement, de coup de poignard ou de piqûre
C	Provoquée par des stimuli normalement indolores dans le territoire du trijumeau affecté.
D	N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Névralgie du trijumeau avec fond douloureux continu

Critère	Intitulé
A	Paroxysmes récurrents de douleur faciale unilatérale dans le territoire d'une ou plusieurs branches du nerf trijumeau, sans irradiation au-delà et répondant aux critères B et C, associées à un fond douloureux continu ou quasi continu entre les crises dans le territoire du trijumeau affecté.
B	La douleur a toutes les caractéristiques suivantes: 1. dure entre une fraction de seconde et 2 minutes 2. intensité sévère 3. à type de choc électrique, d'élançement, de coup de poignard ou de piqûre
C	Provoquée par des stimuli normalement indolores dans le territoire du trijumeau affecté.
D	N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Neuropathie trigéminal douloureuse

Critère	Intitulé
A	Douleur faciale, unilatérale ou bilatérale, dans le territoire d'un ou des deux nerfs trijumeaux et répondant au critère B.
B	Signes cliniques évidents positifs (hyperalgésie, allodynie) et/ou négatifs (hypoesthésie, hypoalgésie) de dysfonctionnement du nerf trijumeau.
C	N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Source : International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3), International Headache Society, 2018.

Névrалgie du nerf intermédiaire

Critère	Intitulé
A	Crises paroxystiques de douleur unilatérale dans le territoire du nerf intermédiaire et répondant au critère B.
B	La douleur a toutes les caractéristiques suivantes : 1. durée de quelques secondes à quelques minutes 2. intensité sévère 3. à type d'élançement, de coup de poignard ou de piqûre 4. déclenchée par la stimulation de la paroi postérieure du conduit auditif et/ou de la région péri-auriculaire
C	N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Note : Un larmoiement, une salivation et/ou des troubles du goût accompagnent parfois la névralgie du nerf intermédiaire

Névrалgie du nerf glossopharyngien

Critère	Intitulé
A	Crises paroxystiques récurrentes de douleur unilatérale dans le territoire du nerf glossopharyngien et répondant au critère B
B	La douleur a toutes les caractéristiques suivantes : 1. dure de quelques secondes à 2 minutes 2. intensité sévère 3. à type de choc électrique, d'élançement, de coup de poignard ou de piqûre 4. déclenchée par la déglutition, la toux, la parole ou le bâillement.
C	N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Névrалgie occipitale (aussi appelée névralgie d'Arnold)

Critère	Intitulé
A	Douleur unilatérale ou bilatérale dans le(s) territoire(s) du grand, du petit ou de la 3ème branche du nerf occipital et répondant aux critères B-D.
B	La douleur a au moins deux des trois caractéristiques suivantes: 1. récurrente lors de crises paroxystiques durant quelques secondes ou minutes 2. intensité sévère 3. à type d'élançement, de coup de poignard ou de piqûre
C	La douleur est associée aux deux éléments suivants: 1. dysesthésie et/ou allodynie évidente lors de la stimulation normalement indolore du cuir chevelu et/ou des cheveux 2. l'un des éléments suivants ou les deux: a) sensibilité à la palpation des branches nerveuses touchées b) zones gâchettes à l'émergence du grand nerf occipital ou dans le territoire de C2
D	La douleur est soulagée temporairement par un bloc anesthésique local du ou des nerfs atteints.
E	N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3.